

MONGUIDEVETERINAIRE



QUESTION CHIEN

Avec la collaboration de vétérinaires spécialistes



Comportement
Urgences
Soins

Dr Valérie Duphot
vétérinaire



SOMMAIRE

Préface du Dr Baussier 5 Introduction de l'auteur 6 Reconnaître une urgence 8

URGENCES & GESTES DE PREMIERS SECOURS

- 14 Maîtriser un chien blessé ou malade
- 18 Malaise grave
- 22 Hémorragie
- 26 Douleur abdominale
- 30 Fracture, entorse & luxation
- 34 Intoxications
- 40 Corps étrangers
- 42 Choc allergique
- 44 Brûlures & choc électrique
- 48 Coup de chaleur
- 50 Hypothermie & gelures
- 54 Noyade
- 56 Morsure & envenimation
- 58 Épilepsie & convulsions
- 62 Convulsions de la chienne gestante
- 64 Mise bas & premiers soins des chiots
- 70 Tête enflée du chiot

- 72 Gonflement d'un testicule
- 74 Écoulement vulvaire

HYGIÈNE & SOINS

- 78 Alimentation
- 86 Vaccins
- 88 Parasites externes & internes
- 92 Hygiène du pelage
- 96 Reproduction & stérilisation
- 100 Trousse à pharmacie
- 102 Administrer un médicament

MALADIES & BLESSURES COURANTES

- 108 Vomissements
- 110 Diarrhée & constipation
- 112 Obésité
- 114 Puces, tiques & moustiques
- 120 Vers & protozoaires
- 124 Plaies
- 126 Fièvre

- 128 Oreilles
- 132 Problèmes oculaires
- 136 Gueule
- 140 Peau & pelage
- 144 Boiteries & douleurs
- 148 Problèmes respiratoires & reniflements
- 150 Glandes anales
- 152 Incontinence & blocage urinaire
- 156 Fin de vie

VIE PRATIQUE

- 160 La race qui vous convient
- 164 Promenades
- 170 Voyages
- 174 Modes de garde

ÉDUCATION

- 178 Histoire & nature du chien
- 182 Récompenses & réprimandes
- 186 Propreté
- 188 Marche en laisse

- 190 Rester seul
- 192 Cohabitation avec d'autres animaux

TROUBLES DU COMPORTEMENT

- 198 Agressif
- 200 Fugueur
- 202 Voleur
- 204 Aboiements
- 206 Destructeur
- 208 Anxieux ou déprimé
- 210 Peureux
- 212 Hypersensible-hyperactif
- 214 Coprophage
- 216 Anorexie
- 218 Tournis & attaque de la queue
- 220 Handicap
- 222 Maltraité ou abandonné
- 224 Comportements spécifiques de la chienne
- 228 Cohabiter avec les enfants
- 232 Changements dans la famille

Adresses utiles 234 Bibliographie 235 Index 236

“*Si mon chien ne respire plus lors d'un malaise, si son cœur ne bat plus, quels sont les bons gestes à connaître?*”

MALAISE GRAVE

FAIRE & NE PAS FAIRE

Ayez toujours à portée de main le numéro de téléphone du service d'urgence vétérinaire proche de chez vous afin de vérifier s'il peut accueillir votre chien en cas de malaise grave (en fonction de l'horaire et du plateau technique dont il dispose). Anticipez en apprenant à réaliser les manœuvres qui peuvent sauver votre chien plutôt que de les découvrir dans l'urgence, le jour où il en aura besoin.

POURQUOI & COMMENT

Un étouffement, l'arrêt de la respiration ou du fonctionnement cardiaque sont des urgences qui menacent la vie du chien à très court terme et nécessitent donc une intervention immédiate pour tenter de le sauver. Ce n'est que lorsque la respiration et l'activité cardiaque sont restaurées que le chien doit être conduit au plus vite chez un vétérinaire pour qu'il prenne en charge l'affection qui a provoqué le malaise.

Un état de choc, un corps étranger bloquant l'entrée de l'air dans les voies respiratoires peuvent provoquer un arrêt respiratoire. Un chiot nouveau-né peut aussi ne pas se mettre à respirer spontanément. Un arrêt du fonctionnement du cœur peut survenir lorsque le chien a une maladie cardiaque, une hémorragie, est en état de choc...

La priorité absolue en cas de malaise grave du chien est de pratiquer une manœuvre de respiration

artificielle et/ou un massage cardiaque pour tenter de relancer la respiration et l'activité du cœur. En cas d'étouffement, dû à la présence d'un corps étranger ou d'un aliment à l'entrée de la trachée, d'un traumatisme du cou, d'une maladie respiratoire, il faut aussi intervenir très vite en dégagant les voies respiratoires pour rétablir le passage de l'air.

« Ayez toujours à portée de main le numéro de téléphone du service d'urgence vétérinaire. »

SYMPTÔMES & DIAGNOSTIC

Pour savoir si votre chien est en arrêt cardiaque, regardez les mouvements de son thorax. Cherchez un éventuel souffle respiratoire en approchant votre oreille de sa gueule. En posant la paume de votre main sur son thorax, à gauche, recherchez les battements cardiaques. Si vous ne percevez aucun souffle, ni aucun battement du cœur, que le thorax ne se soulève pas, il est en arrêt cardiaque et respiratoire. Un chien qui étouffe est agité, a du mal à respirer, une respiration bruyante, ses muqueuses bleuissent.

Effectuer la respiration artificielle

C'est l'équivalent du bouche-à-bouche. Cette manœuvre ne doit être effectuée que sur un chien

“*Mon chien a mangé de la mort-aux-rats.
Il a volé du chocolat noir. Il a des convulsions.
Du sang coule de son nez.*”

INTOXICATIONS

FAIRE & NE PAS FAIRE

Si votre chien a avalé un produit toxique, n'essayez pas de le faire vomir sans l'accord du vétérinaire : il prendra sa décision en fonction de la nature du toxique si vous le connaissez et de l'intervalle de temps entre l'intoxication et votre appel.

Ne lui faites pas boire de lait.

S'il a été en contact avec un toxique, ne le lavez pas sans l'accord du praticien.

Appelez un centre antipoison vétérinaire si vous connaissez la nature du toxique pour connaître les risques et la conduite à tenir. Conduisez votre chien en urgence chez un vétérinaire.

POURQUOI & COMMENT

Les produits toxiques peuvent être avalés, inhalés ou absorbés par la peau. Les symptômes de l'intoxication apparaissent immédiatement ou quelques heures, voire plusieurs jours, plus tard.

Les principales causes d'intoxication chez le chien sont l'ingestion accidentelle ou due à la malveillance, à la maison, dans la rue ou le jardin, d'un produit toxique et l'administration d'un médicament inapproprié.

Les intoxications concernent surtout les chiots, qui explorent davantage leur environnement et n'hésitent pas à avaler ce qu'ils y trouvent, mais des

chiens adultes peuvent aussi ingérer des produits dangereux.

Les toxiques les plus souvent en cause sont :

- **Les poisons pour tuer les rongeurs** (mort-aux-rats à base d'anticoagulants, crimidine), **les limaces** (métaldéhyde, présent aussi dans certains allume-barbecues), **les corbeaux** (chloralose), **les taupes** (strychnine) et **les insectes** (organophosphorés), en vente libre en France, où ils sont utilisés sans contrôle. Certains sont présentés sous forme d'appâts attirants pour les chiens, qui peuvent les rencontrer dans les jardins, les caves, les parkings souterrains, certains restaurants, les fermes, les écuries (petits sachets de mort-aux-rats transparents contenant des graines colorées).

« *Certaines plantes d'ornement (figus, caoutchouc, muguet, dieffenbachia) sont toxiques pour les chiens.* »

Les symptômes de l'intoxication dépendent de la nature du produit. Les anticoagulants des raticides et souricides provoquent des hématomes, de l'hématurie (sang dans l'urine), une pâleur des muqueuses, des vomissements contenant du sang... Il s'agit d'une



“
*Mon chien a la face gonflée.
 Il a du mal à respirer subitement. Il est prostré.*
 ”

CHOC ALLERGIQUE

FAIRE & NE PAS FAIRE

En cas de choc anaphylactique ou de réaction allergique importante : le chien doit être conduit en urgence chez le vétérinaire.

S'il ne respire plus ou que son cœur s'arrête : ouvrez la gueule, tirez légèrement sur la langue pour dégager la gorge et effectuez un massage cardiaque pour tenter de le réanimer.

Si votre chien est diagnostiqué allergique : le médicament prescrit par son vétérinaire pour traiter son allergie doit toujours être rapidement accessible.

POURQUOI & COMMENT

Le choc anaphylactique est une réaction allergique grave, parfois mortelle. Chez le chien, il peut survenir après une piqûre d'insecte (abeille, guêpe) ou d'araignée, donc surtout à la saison chaude.

Beaucoup plus rarement, un chien peut présenter un choc anaphylactique dû au principe actif d'un médicament ou à une vaccination.

Il se produit immédiatement après le contact avec la substance allergisante ou progressivement, quelques heures plus tard. Il nécessite toujours une consultation en urgence.

La salive des puces, certains ingrédients des aliments, des végétaux, des produits ménagers... peuvent provoquer une réaction allergique chez certains chiens, se traduisant par des symptômes

cutanés. Pour soulager le chien et éviter une infection des lésions, la prise en charge par un vétérinaire est nécessaire.

SYMPTÔMES & DIAGNOSTIC

Lors de choc anaphylactique, le chien a des difficultés pour respirer, il peut présenter un collapsus (difficulté à rester debout, voire syncope ou inconscience), un gonflement de la face, une rougeur ou une décoloration de la peau, une douleur et un gonflement là où l'insecte ou l'araignée l'a piqué, qui peuvent s'étendre à d'autres parties du corps.

« Lors de choc anaphylactique, le chien peut présenter une rougeur ou une décoloration de la peau là où l'insecte l'a piqué. »

C'est particulièrement spectaculaire lorsqu'il a été piqué au museau ou au cou. On peut aussi observer des démangeaisons et des élevures rouges sur son abdomen. Il peut vomir et avoir la diarrhée.

Lors d'allergie cutanée, le chien présente des démangeaisons et rapidement des lésions dues à ses griffes quand il se gratte, une peau rouge et gonflée, avec parfois des boutons, surtout sur l'abdomen. ●



🇨🇭 L'AVIS DU VÉTÉRINAIRE

CONSEILS

▶ Si votre chien a du mal à respirer ou qu'il présente les symptômes d'un choc (anxiété, prostration, temps de remplissage capillaire augmenté [c'est-à-dire le temps que met la muqueuse des gencives à redevenir rose après pression du doigt] [voir chapitre *Évaluer l'état de santé*, p. 8], fréquence cardiaque élevée, perte de conscience), emmenez-le en urgence chez un vétérinaire.

▶ S'il ne respire plus, tentez une manœuvre de réanimation (uniquement sur un chien inconscient) en pratiquant la respiration artificielle (voir chapitre *Malaise grave*, p. 18).

▶ Si votre chien est inconscient et que vous ne percevez pas de battement cardiaque (en posant la main sur sa cage thoracique, en haut à gauche), vous pouvez effectuer un massage cardiaque pour relancer l'activité du cœur.

▶ En cas de piqûre d'insecte, si le dard (il ressemble à une petite épine noire) est encore présent, retirez-le avec précaution, sans appuyer pour

qu'il ne libère pas davantage de substance allergisante. Appliquez sur la piqûre de la glace enveloppée dans une serviette (pas de contact direct entre la peau et les glaçons) et conduisez votre chien chez le vétérinaire.

PRÉVENTION

▶ Si votre chien a été diagnostiqué allergique, ayez toujours à portée de main le médicament prescrit par votre vétérinaire pour faire face à une piqûre d'insecte.

▶ Lors d'allergie cutanée, une consultation vétérinaire s'impose pour soulager votre chien de ses démangeaisons, rechercher et évincer de son environnement l'allergène en cause (parfois un traitement contre les puces suffit) et éviter que les lésions ne s'infectent.

⚠️ NE PAS FAIRE

N'administrez jamais de médicament par voie orale à un chien inconscient, s'il vomit ou s'il a des difficultés à respirer.

“*Mon chien est resté longtemps dans la voiture au soleil. Il a du mal à respirer. Ses muqueuses sont bleues.*”

COUP DE CHALEUR

FAIRE & NE PAS FAIRE

Ne laissez jamais un chien dans une voiture, même les fenêtres ouvertes. Ne le faites pas voyager en voiture aux heures chaudes, surtout s'il est âgé, malade ou d'une race à museau court. Ne le laissez pas s'endormir au soleil. Ne lui faites pas faire d'exercice prolongé par temps chaud.

Votre chien doit toujours disposer d'une écuelle d'eau propre et fraîche.

En cas de coup de chaleur, refroidissez-le au plus vite avec de l'eau froide ou des glaçons sur sa nuque jusqu'à ce que sa température rectale diminue. Conduisez-le ensuite chez un vétérinaire.



POURQUOI & COMMENT

Le coup de chaleur survient lorsque le chien est exposé à une température élevée, en général au printemps et en été. Sa température interne monte à plus de 40 °C et sa vie est menacée. Contrairement aux humains, le chien ne peut pas réguler la température de son organisme par la sudation (il ne transpire que par ses coussinets plantaires). Il le fait par sa respiration, gueule ouverte et avec une fréquence augmentée des mouvements respiratoires. Lorsque la température extérieure est trop élevée, la respiration ne permet plus de maintenir constante la température interne.

La plupart des coups de chaleur arrivent quand le chien est enfermé dans une voiture, à l'arrêt ou en mouvement (la température peut monter à 50 °C dans l'habitacle). Ils peuvent aussi se produire dans un jardin ou dans la maison chez les chiens âgés, malades ou à museau court (bulldog anglais...), qui régulent moins bien leur température interne par la respiration.

« Contrairement aux humains, le chien ne peut pas réguler la température de son organisme par la sudation. Il le fait par sa respiration, gueule ouverte. »

SYMPTÔMES & DIAGNOSTIC

Votre chien a du mal à respirer, ses muqueuses deviennent rouges puis bleues par manque d'oxygène.

Il est inconscient ou agité, il salive.

Sa température rectale est supérieure à 40 °C.

Sa fréquence cardiaque est augmentée.

Il peut vomir ou avoir la diarrhée. ●



🇨🇷 L'AVIS DU VÉTÉRINAIRE

- ▶ En cas de coup de chaleur, rentrez votre chien dans un lieu frais. Prenez sa température rectale.
- ▶ Refroidissez sa nuque à l'eau froide ou en y maintenant une serviette contenant des glaçons.
- ▶ Pour le reste du corps, évitez un refroidissement trop brutal à l'eau froide pour ne pas provoquer un choc. Vous pouvez placer ses pattes dans une cuvette d'eau froide.
- ▶ Reprenez ensuite sa température pour voir si elle baisse. Si elle retombe à 39 °C en un quart d'heure, vous pouvez arrêter de rafraîchir votre chien. Elle devrait revenir à la normale (38-38,5 °C).
- ▶ Dans tous les cas, votre chien doit consulter un vétérinaire très vite car l'hyperthermie peut avoir des conséquences néfastes, qu'il faut traiter médicalement : troubles du rythme cardiaque, de la coagulation sanguine, insuffisance rénale...

TOUT SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE CHIEN



URGENCES • MALADIES • COMPORTEMENT • ÉDUCATION

*“ Votre chien s’est intoxiqué ?
Vous vous interrogez sur son alimentation ?
Comment lui apprendre la propreté ?
Savoir réagir en cas d’agressivité... ”*

Technique et scientifique, cet ouvrage est destiné aux propriétaires de chiens, en attendant la consultation du vétérinaire. Les photos vivantes et amusantes le rendent particulièrement attractif et accessible pour tous les amoureux des chiens.

Le docteur **Valérie Duphot**, vétérinaire, s’est entourée de confrères qui ont apporté leur regard d’expert sur le comportement, la dermatologie, la médecine de l’élevage et du sport, la nutrition, la parasitologie, la réanimation, la reproduction et les urgences.

Avec une préface du docteur Michel Baussier, président du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires.

ISBN : 978-2-9550901-0-7



9 782955 090107

24,90 € TTC

AWAX
PRODUCTIONS

www.question-animaux.com